

ฟาโมทีดีน  
ความแรง 20 และ 40 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ฟาโมทีดีน (famotidine)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร/ลำไส้เล็กส่วนต้น
- รักษาโรคกรดไหลย้อนที่อาการเล็กน้อยถึงปานกลาง
- รักษาภาวะที่กระเพาะอาหารสร้างกรดจำนวนมากกว่าปกติ (กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสัน)

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- มะเร็งกระเพาะอาหาร
- โรคไต หรือ ไตทำงานผิดปกติ
- ใช้ยานี้ในขนาดสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
- หญิงตั้งท้องควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งท้อง เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- หญิงให้นมลูกควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ตลอดช่วงการให้นมลูก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา
- ปรับพฤติกรรมกรรมการกินอาหารตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเพื่อผลการรักษาที่ดี

### ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Page/s/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- โรคปอดอักเสบ เช่น หายใจไม่อึด หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ไอแห้ง
- ตับทำงานผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี

#### อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย หรือ ท้องผูก
- คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องอืด
- ปากแห้ง ไม่อยากอาหาร การรับรสผิดปกติ
- ปวดหัว เวียนหัว รู้สึกเหนื่อยล้า

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: ฟาโมทีดีน

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2566