

ดิลไทอะเซม

ความแรง 30 และ 60 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ดิลไทอะเซมไฮโดรคลอไรด์ (diltiazem hydrochloride)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาและป้องกันอาการเจ็บแค้นหน้าอก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- หญิงให้นมลูกห้ามใช้ยานี้ เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- มีภาวะอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่า 50 ครั้งต่อนาที
- เป็นโรคหัวใจล้มเหลว
- เป็นโรคหัวใจหรือหัวใจทำงานผิดปกติรุนแรง
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาไอวอบราดิน

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- มีประวัติเป็นโรคหัวใจ หายใจไม่อิ่ม หัวใจเต้นช้า หรือความดันโลหิตต่ำ
- อาการแพ้ปรวน โรคซึมเศร้า
- ล่าไส้หรือทางเดินอาหารผิดปกติ
- อายุมากกว่า 65 ปี
- เป็นหรือมีประวัติเป็นโรคหอบหืด
- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ

- หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เวียนหัว ร่วมกับ มองภาพเบลอ เจ็บแค้นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้หากต้องการผ่าตัดหรือทำฟัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Page/s/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- หอบหืดกำเริบ หรืออาการหอบแย่ง
- หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด แน่นหน้าอก
- ตับทำงานผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย
- ปวดหัว เวียนหัว อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
- รู้สึกอ่อนวูบวาบ
- คลื่นไส้ อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสัญญา: ดิลไทอะเซมไฮโดรคลอไรด์

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2566

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร