

โคลไทรมาโซล
ความแรง 100 และ 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดสอดช่องคลอด

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โคลไทรมาโซล (clotrimazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคเชื้อราในช่องคลอด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ระหว่างช่วงที่มีประจำเดือน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ติดเชื้อราในช่องคลอดมากกว่า 2 ครั้ง ใน 6 เดือน
- คุณนอนหรือคูรักเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- อายุต่ำกว่า 16 ปี หรืออายุมากกว่า 60 ปี
- มีอาการ เช่น ตกขาวมีกลิ่นเหม็น ช่องคลอดมีเลือดออกผิดปกติ มีแผลหรือตุ่มบริเวณช่องคลอด ปวดเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะออกยาก มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- วิธีเหน็บช่องคลอด
 1. ล้างมือให้สะอาด
 2. แกะกระดาษห่อออกแล้วจุ่มในน้ำสะอาดพอให้ยาขึ้น (ประมาณ 1-2 วินาที) เพื่อลดการระคายเคือง
 3. นอนหงายโดยชันเข่าขึ้นและแยกขาออก
 4. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้นิ้วหรือเครื่องช่วยสอดดันยาเข้าไป
 5. นอนในท่าเดิมประมาณ 15 นาที จนกว่ายาจะละลายหมด

3.2 หากลืมเหน็บยาควรทำอย่างไร

- เหน็บยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องเหน็บยาอีกครั้งไม่ต้องเหน็บยาที่ลืม แล้วเหน็บยาครั้งต่อไปตามปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล
- หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อและการรักษา เพราะอาจทำให้คุณนอนติดเชื้อได้
- หากใช้ยานี้แล้ว 7 วัน อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้อาจลดประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดที่ทำจากยาง เช่น ถุงยางอนามัย ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นอย่างน้อย 5 วันหลังใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวนิ่ง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ช่องคลอดมีแผลลอก
- คัน ระคายเคืองช่องคลอด
- แสบร้อน เจ็บ บริเวณปากช่องคลอด
- ตกขาว หรือ ช่องคลอดมีเลือดออก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสำคัญ: โคลไทรมาโซล

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>