

ยาลดกรด

อะลูมินา-แมกนีเซียม

ชนิดเม็ดและชนิดน้ำแขวนตะกอน [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) และ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
- รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียมาก ไม่มีแรง
- มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
- มีภาวะลำไส้ตีบตัน หรืออุดตัน

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินภายใน 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงหลังอาหาร และก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ

ยาเม็ด: เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 เม็ด

ยาน้ำ: เขย่าขวดก่อนใช้ยา

ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 ช้อนชา

เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา

เด็ก 3-6 ปี: กินครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้นานกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามกินยานี้พร้อมกับยาอื่น หรือควรกินยานี้ห่างจากยาอื่นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องผูกหรือท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

ลักษณะยาเม็ด: ยาเม็ดกลมสีขาว หรือสีขาวหม่น
ตัวยาสําคัญ:

- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
- แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์

ขนาดบรรจุ:

- ยาเม็ด แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียมแผงละ 4 หรือ 10 เม็ด

ลักษณะยาน้ำ: ยาน้ำแขวนตะกอนมีสีขาวขุ่น
ตัวยาสําคัญ:

- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
- แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์

ขนาดบรรจุ:

- ยาน้ำ ขวดละ 240 หรือ 450 มิลลิลิตร

ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดาามินท์ ชนิดเม็ด [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โซดาามินท์ ประกอบด้วยตัวยา โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ น้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ (peppermint oil)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ลดอาการระคายเคืองเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต หรือ โรคตับ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง
- มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
- มีภาวะเลือดเป็นด่างสูง
- กำลังใช้ยาสเตอรอยด์

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ หรือ อยู่ระหว่างให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 3-6 เม็ด
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-3 เม็ด
- กินหลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้นานกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- บวมหน้า

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ปวดท้อง ใดๆ ที่ท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสาคัญ:
 - โซเดียมไบคาร์บอเนต 300 มิลลิกรัม
 - น้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ 0.003 มิลลิลิตร
- ขนาดบรรจุ: แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม
แผงละ 4 และ 10 เม็ด

ยาขับลม ชนิดน้ำ [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาขับลม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ ทิงเจอร์กระวานเทศ (compound cardamom tincture) ทิงเจอร์พริกสกัดเข้มข้น (strong capsicum tincture) และ ทิงเจอร์ขิงสกัดเข้มข้น (strong ginger tincture)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง

- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเด็ก และหญิงตั้งครรภ์

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
- กินวันละ 3-4 ครั้ง
- เขย่าขวดก่อนใช้ยา

3.2 หากมีอาการของโรคอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้วสามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรรับประทานยานี้เป็นเวลานานเกินกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
- ยานี้ไม่ใช่ยารักษาโรคกระเพาะ เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นเท่านั้น

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://ndi.fda.moph.go.th)

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสสีแดง
- ตัวยาสำคัญใน 15 มิลลิลิตร:
 - ทิงเจอร์กระวานเทศ 0.035-1.8 มิลลิลิตร
 - ทิงเจอร์พริกสกัดเข้มข้น 0.06-0.5 มิลลิลิตร
 - ทิงเจอร์ขิงสกัดเข้มข้น 0.024-0.2 มิลลิลิตร
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 180, 240 และ 450 มิลลิลิตร

ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ยาธาตุน้ำแดง
ชนิดน้ำ
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือโซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ ทิงเจอร์โกศน้ำเต้า (compound rhubarb tincture)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
- กินยาก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง
- เขย่าขวดก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://ndi.fda.moph.go.th)

<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำมีสีเข้ม
- ตัวยาสำคัญใน 15 มิลลิลิตร:
 - โซเดียมไบคาร์บอเนต 0.15-0.6 กรัม
 - ทิงเจอร์โกศน้ำเต้า 0.5-2 มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ทิงเจอร์กระวานเทศ, ทิงเจอร์ขิงสกัด, เหล้าสาระแทน เป็นต้น
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 180, 240 และ 450 มิลลิลิตร

ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต ชนิดน้ำ [ข้อควรคำ ปรึบตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต หรือ โรคตับ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง
- มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
- มีภาวะเลือดเป็นด่างสูง
- กำลังใช้ยาสเตอรอยด์

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ป้อนให้เด็กหรือทารกหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ
- เด็ก 1-6 เดือน: กินครั้งละ 1 ช้อนชา
- เด็ก 6-12 เดือน: กินครั้งละ 2 ช้อนชา
- เด็ก 2-3 ปี: กินครั้งละ 2-3 ช้อนชา
- กินวันละ 6 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้นานกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- บวมน้ำ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสไม่มีสี
- ตัวยาสําคัญใน 5 มิลลิลิตร: โซเดียมไบคาร์บอเนต 50 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 60 มิลลิลิตร

**ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ทิงเจอร์มหาหิงค์
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]**

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ทิงเจอร์มหาหิงค์ (asafetida tincture)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง
- ไม่ควรให้เด็กกินยานี้ เพราะทิงเจอร์มหาหิงค์มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อเด็ก

3.2 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ควรทายาด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปาก หรือเข้าตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำมีสีเข้ม
- ตัวยาสําคัญ: มหาหิงค์ 20% โดยมวลต่อปริมาตร
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 15, 30 และ 60 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

[ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.](https://ndi.fda.moph.go.th)

<https://ndi.fda.moph.go.th>

ยาลดกรด

อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมธิโคน
ชนิดเม็ดและชนิดน้ำแขวนตะกอน
[ข้อควรคำ ปรึบตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) และ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide) และไซเมธิโคน (simethicone)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และช่วยขับลม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
- รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียมาก ไม่มีแรง
- มีภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินภายใน 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงหลังอาหาร และก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ
- ยาเม็ด: เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน
 - ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 เม็ด
 - เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 เม็ด
- ยาน้ำ: เขย่าขวดก่อนใช้ยา
 - ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 ช้อนชา
 - เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา
 - เด็ก 3-6 ปี: กินครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามกินยาพร้อมกับยาอื่น ควรกินยานี้ห่างจากยาอื่น 2 ชั่วโมง เพราะยานี้อาจจะติดกันกับยาอื่น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์แต่ถ้าอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที

- ท้องผูกหรือท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด หรือ ยาน้ำมีสีขาวขุ่น
- ตัวยาสําคัญ: อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ และไซเมธิโคน
- ขนาดบรรจุ:
 - ยาเม็ด แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียมละ 4,10 เม็ด
 - ยาน้ำ ขวดละ 240 และ 450 มิลลิลิตร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยาผงฟูชนิดทริคแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต ชนิดผงฟูละลายน้ำ [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ซิตริกแอซิด (citric acid anhydrous) โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อลดกรด บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต หรือ โรคตับ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง
- อายุต่ำกว่า 12 ปี (ยกเว้นแพทย์สั่ง)

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ หรือ อยู่ระหว่างให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผสมน้ำก่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 1 ชวง
- กินซ้ำได้อีกภายใน 2-3 ชั่วโมง ถ้าต้องการ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากไม่มีอาการแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ ผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- หากใช้ยาแล้วยังคงมีอาการหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 2 สัปดาห์

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567 ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- บวมหน้า

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดท้อง ท้องอืด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ผงมีสีอ่อน ๆ หรือสีขาว
- ด้วยาสาคัญ:
 - ซิตริกแอซิด ไม่เกิน 1.85 กรัม
 - โซเดียมไบคาร์บอเนต ไม่เกิน 1.96 กรัม
 - โซเดียมคาร์บอเนต ไม่เกิน 0.43 กรัม
- ขนาดบรรจุ: ชวงอะลูมิเนียม ไม่เกิน 4.3 กรัม

ไซเมธิโคน
ความแรง 40 และ 80 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไซ-เม-ธิ-โคน (simethicone)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาขับลม

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดเนื่องจากมีแก๊สในทางเดินอาหาร ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ทะลุ

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- ตั้งท้อง วางแผนตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เคี้ยวยาก่อนกลืน
- ขนาด 40 มิลลิกรัม กินครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการวันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 12 เม็ด)
- ขนาด 80 มิลลิกรัม กินครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการวันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 6 เม็ด)

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ทันที
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้าอาการของโรคไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือมีอาการรุนแรงขึ้นควรไปพบแพทย์
- บอกชื่อยานี้ให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล คลินิก หรือร้านยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน
- ท้องเสีย ปวดท้อง
- เรอ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นเม็ด บรรจุในแผง
- ตัวยาสําคัญ คือ ไซเมธิโคน ความแรง 40 และ 80 มิลลิกรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ผงน้ำตาลเกลือแร่ (Oral Rehydration Salt: ORS) [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ผงน้ำตาลเกลือแร่
- เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้ท้องเสีย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทดแทนการเสียน้ำและเกลือแร่ในผู้ที่มีอาการท้องเสีย หรืออาเจียนมากๆ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคหัวใจ
- มีโรคไต
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- เทผงยาทั้งหมดลงในน้ำสะอาด 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร)
- เด็กอายุมากกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่ ดื่ม 1 แก้วต่อการถ่าย 1 ครั้ง
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อย (10 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อการถ่าย 1 ครั้ง)
- หลังผสมน้ำแล้ว ควรดื่มภายใน 24 ชั่วโมง หากดื่มไม่หมดให้ทิ้งยา ไม่ควรเก็บไว้ข้ามคืน

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ทันที

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้าผู้ป่วยมีอาการ ถ่ายเพิ่มมากขึ้น อาเจียนมาก มีไข้สูง เหงื่อออกมาก ตัวเย็น หรือหมดสติ ควรนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://ndi.fda.moph.go.th)

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจุดตามผิวหนัง
- ชักเกร็ง จากเกลือโซเดียมในเลือดสูง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ซึม อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร กระหายน้ำ จากเกลือโซเดียมในเลือดสูง
- ปวดหัว คลื่นไส้ จากเกลือโซเดียมในเลือดต่ำ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นผงแห้ง บรรจุในซอง
- **ตัวยาสําคัญใน 1 ซอง :**
 - โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) 0.650 กรัม
 - ไตรโซเดียมซิเตรตไดไฮเดรต (trisodium citrate dihydrate) 0.725 กรัม
 - โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) 0.375 กรัม
 - กลูโคส (glucose) 3.375 กรัม

ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย
ความแรง 250-350 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด/แคปซูล
[ข้อควรคำ ปรึบตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ผงถ่านชาร์โคล (activated charcoal)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาอาการท้องเสีย

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้ทะลุหรือลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ทำงานผิดปกติ
- เพิ่งได้รับการผ่าตัดรักษาเมื่อเร็ว ๆ นี้
- มีความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร เช่น ต้มเหล้าเป็นประจำ ใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเสด เป็นต้น

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยานี้ห่างจากยาอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ กินครั้งละ 3-4 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามกินยานี้พร้อมกับยาอื่น เพราะยานี้อาจจะตีกันกับยาอื่น
- ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน หลังใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผื่นหนัง
- ปวดท้องร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อุจจาระมีสีดำ
- อาเจียน
- สำลักเศษอาหาร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ดสีดำ หรือแคปซูลเปลือกแข็ง
- ด้วยาสำคัญ: ผงถ่านชาร์โคล 250-350 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: แผงละไม่เกิน 10 เม็ดหรือแคปซูล

ยาระบาย กลีเซอริน
ชนิดเหน็บทวาร
(Glycerin suppository)
[ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบายกลีเซอริน (glycerin suppository)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้อุดตัน

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคเบาหวาน
- ตั้งท้อง โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งท้อง
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่ ใช้ขนาดใหญ่ (2.55 กรัม) เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง
- เด็ก ใช้ขนาดเล็ก (1.5 กรัม) เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง
- ถ้ามีอาการปวดท้อง อยากรถ่าย ให้รอ 15 นาที เพื่อให้ยาละลาย
- ห้ามกลืนยานี้เด็ดขาด
- วิธีใช้ยาเหน็บทวาร ศึกษาเพิ่มเติมจากท้ายเอกสาร

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังใช้ยานี้ถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้องใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ควรไปพบแพทย์
- ไม่แนะนำ ให้ใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดท้อง
- ระคายเคืองบริเวณทวารหนัก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น
- เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นแท่งบรรจุในแผง
- ตัวยาสสำคัญ คือ กลีเซอริน (glycerin)

วิธีใช้ยาเหน็บทวาร

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ถ้ายาเหน็บนิ่ม ให้แช่ยาในตู้เย็นหรือน้ำเย็นก่อนแกะยาออกจากห่อ เพื่อให้ยาแข็งตัวและสอดได้ง่ายขึ้น
3. แกะยาออกจากห่อ
4. นอนตะแคง โดยให้ขาข้างเหยียดตรง และงอขาข้างที่อยู่ด้านบนให้หัวเข่าอยู่ใกล้หน้าอก หรือ ยืนตรงยกขาข้างหนึ่งขึ้นเหยียบบนเก้าอี้ หรือนั่งยอง ๆ แยกขาเล็กน้อยคล้ายเวลานั่งถ่าย
5. เอามืออ่อนขวาไปดันหลังแล้วสอดยาเหน็บเข้าไปในทวารหนัก โดยให้ด้านที่เรียกว่าเข้าไปก่อน ใช้นิ้วค่อย ๆ ดันยาเข้ารูทวารหนัก จนยาทั้งแท่งอยู่เหนือหูรูดทวารหนัก เพื่อไม่ให้แท่งยาหลุดออกมา
6. นอนในท่าเดิม ประมาณ 15 นาที
7. หากมีอาการอยากถ่ายอุจจาระ ให้อั้นไว้เพื่อให้ยาละลาย อย่างน้อย 15 นาที



แสดงท่านอนเพื่อสอดยาเหน็บทวารหนัก



แสดงลักษณะการสอดยาเข้าไปในทวารหนัก



แสดงวิธีการสอดยาเหน็บทวารหนักทำเป็น

ยาระบาย แมกนีเซียม
ชนิดน้ำแขวนตะกอน
(Milk of Magnesia)
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบายแมกนีเซียม (Milk of Magnesia)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ที่ยังไม่ได้รับการรักษา

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หาก ท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคไต
- ใช้ยา สมุนไพรร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เขย่าขวดก่อนใช้ยา
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- เด็ก 1-6 ปี กินครั้งละ 1-3 ช้อนชา (5-15 มิลลิลิตร) ก่อนนอน
- ไม่แนะนำให้กินยาต่อเนื่องเกิน 3 วัน

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมือถัดไป
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังใช้ยานี้ ถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้น หรือมีอาการปวดท้องมากขึ้น ควรไปพบแพทย์
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้องใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ ควรไปพบแพทย์

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย
- ปวดท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยามีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่เปิดใช้ครั้งแรก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นน้ำแขวนตะกอน บรรจุในขวด
- **ตัวยาสําคัญ** คือ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide)

ยาระบาย มะขามแขก
ชนิดเม็ด
(Senna Tablet)
[ข้อการดำ ปรึบตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบาย มะขามแขก
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการท้องผูก ในเด็กอายุมากกว่า 6 ปี และผู้ใหญ่

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะลำไส้อุดตัน
- มีโรคลำไส้อักเสบ หรือกำลังเป็นไส้ติ่งอักเสบ
- มีโรคหัวใจล้มเหลว
- มีภาวะสูญเสียน้ำอย่างรุนแรง
- มีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน
- มีเลือดออก ปนมากับอุจจาระ
- ตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคไต
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 3-4 เม็ด ก่อนนอน
- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 1-2 เม็ด ก่อนนอน

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมือถัดไป
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังกินยาถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้นใน 3 วัน หรือมีอาการปวดท้องมากขึ้น ควรไปพบแพทย์
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้องใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ ควรไปพบแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย
- ปวดเกร็งท้อง
- คลื่นไส้ เวียนหัว
- ลำไส้ทำงานน้อยลง ท้องผูกเมื่อหยุดใช้ยา
- คอแห้ง หน้ามืด จากการสูญเสียน้ำ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นเม็ด
- **ตัวยาสำคัญ** คือ มะขามแขก ที่มีปริมาณสารสำคัญเทียบเท่า เซนโนไซด์ บี (Sennoside B) 7.5 มิลลิกรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาระบาย โซเดียมคลอไรด์ ชนิดสวนทวาร (Sodium Chloride Enema) [ข้อควรค่า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาระบายโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride enema)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาระบาย

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้สวนทวารให้ถ่ายอุจจาระ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคลำไส้กลืนกัน
- มีโรคลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ไม่เคลื่อนไหว
- มีโรคลำไส้อักเสบ
- มีเลือดออกทางทวารหนัก
- มีโรคไส้ติ่งอักเสบ
- มีโรคหัวใจ
- มีอาการปวดท้อง

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่สามารถคุมความดันได้
- มีภาวะท้องโต มีน้ำในช่องท้อง
- มีแผลที่ทวารหนัก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้สวนทวารเท่านั้น
 - ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 20-30 มิลลิลิตร
 - เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร
 - เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้งละ 5-10 มิลลิลิตร
 - ถ้ามีอาการปวดท้องอยากถ่าย ให้นอนในท่าเดิม ประมาณ 15 นาที หรือจนกว่าจะทนไม่ไหว เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มที่
 - วิธีการใช้ยาสวนทวารศึกษาเพิ่มเติมจากท้ายเอกสาร
- ### 3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังใช้ยานี้ถ้าอาการท้องผูกไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ควรไปพบแพทย์
- ไม่ควรใช้ยานี้ต่อเนื่อง เป็นเวลานาน
- ถ้าหยุดใช้ยาแล้วกลับไปมีอาการท้องผูก หรือต้องใช้ยาระบายทุกวันเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ ควรไปพบแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- มีเลือดออกทางทวารหนัก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- คอแห้ง กระหายน้ำ จากการสูญเสียยา
- ท้องเสีย
- ปวดท้อง
- รู้สึกคัน หรือระคายเคือง บริเวณทวารหนัก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทโดยตรง หรือในที่ชื้น
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นน้ำใส บรรจุในหลอดพลาสติก
- **ตัวยาสําคัญ** คือ โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride 15% w/v)

วิธีใช้ยาสวนทวารหนัก

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ถ้ามีฝาปิดหลอดสวน ให้เอาฝาปิดออกก่อน และหลอกลื่นปลายหลอด สารด้วยสารหล่อลื่น
3. นอนตะแคงโดยใช้ขาข้างเหยียดตรง และงอขาข้างที่อยู่ด้านบนหัวเข่าอยู่ใกล้หน้าอก
4. สอดปลายหลอดสวนเข้าไปในทวารหนัก สอดโดยค่อยๆ หมุนขวดยาเข้าไปอย่างช้าๆ
5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดหรือภาชนะบรรจุให้น้ำยาอย่างช้าๆ จนน้ำยาหมด
6. ขมิบทวารหนักไว้ 2-3 วินาที
7. นอนในท่าเดิมประมาณ 15-30 นาที หรือจนกว่าจะทนไม่ได้ จึงลุกไปถ่ายอุจจาระ เนื่องจากหากถ่ายอุจจาระทันทีที่รู้สึกอยากถ่าย อาจทำให้ยาออกมาจากทวารหนักก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาถ่ายพยาธิตัวกลม
มีเบนดาโซล
ความแรง 100 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเดี่ยว
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า มีเบนดาโซล (mebendazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อถ่ายพยาธิเส้นด้าย พยาธิตัวกลม, พยาธิไส้เดือน, พยาธิแส้ม้า, พยาธิปากขอ, พยาธิเข็มหมุด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
- หญิงมีท้อง หรือสงสัยว่าจะตั้งท้อง

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- อยู่ระหว่างให้นมลูก
- เป็นโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
- สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด: กินครั้งละ 1 เม็ด เพียงครั้งเดียว
- สำหรับพยาธิตัวกลมอื่น ๆ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนและพยาธิแส้ม้า: กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เข้า-เย็น ติดต่อกัน 3 วัน
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง
- มีไข้สูง อาการชัก ตัวแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุกหมดสติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม เบื่ออาหาร
- เป็นไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องอืด
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: มีเบนดาโซล 100 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียมละ 6 เม็ด

พลาสติกบรรจุภัณฑ์ ชนิดแผ่นแปะ [ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า พลาสติกบรรจุภัณฑ์ชนิดแผ่นแปะ ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยาแอสไพริน
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- แปะพลาสติกบริเวณที่มีอาการปวด
- ล้างทำความสะอาดผิวหนังก่อนที่จะแปะพลาสติก
- ควรเปลี่ยนพลาสติกวันละ 1-2 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการแปะพลาสติกใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- ล้างมือทุกครั้งหลังจากแปะพลาสติก

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- แสบ ร้อน บริเวณที่แปะพลาสติก

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นพลาสติกสำหรับแปะผิวหนัง
- **ตัวยาสำคัญ** คือ พิมเสน (borneol) การบูร (camphor) ยางอินเดีย (caoutchouc) เอทิลีนไกลคอลซาลิไซเลต (ethylene glycol salicylate) น้ำมันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil) เมนทอล (menthol) เมทิลซาลิไซเลต (methyl salicylate) น้ำมันสะระแหน่ (peppermint oil) ไทมอล (thymol) สารสกัดพริก (capsaicin extract) โพลีบิวทีน (polybutene) ผงพริก (capsicum powder) สารสกัดพริกแดง (capsicum oleoresin) ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) <ปรับข้อมูลตามทะเบียนยา>

- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 12 แผ่น

ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน
ความแรง 2 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
[ข้อควรคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า คลอร์เฟนิรามีน (chlorpheniramine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น น้ำมูกไหล ตาแดง คันตา คันจมูก ในโรคเยื่อจมูกอักเสบ หรือใช้ละอองพาง หรือ เพื่อบรรเทาอาการแพ้บริเวณผิวหนัง เช่น ลมพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- ใช้ยาด้านซึมเศร้าประเภท " ยับยั้ง โมโนเอมีน ออกซิเดส" ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือ โรคหัวใจ
- ไต หรือ ตับ ทำงานผิดปกติ
- ผู้ป่วยโรคลมชัก
- ผู้ป่วยโรคหอบหืด
- ต่อมลูกหมากโต มีภาวะปัสสาวะขัด
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- เป็นต้อหิน ความดันในลูกตาสูง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่เกิน 12 เม็ด/วัน
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1 เม็ด ไม่เกิน 6 เม็ด/วัน
- กินทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้วสามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ไม่ควรกินร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 1 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- มีไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
- ปัสสาวะขัด ปัสสาวะออกน้อยลง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปากแห้ง คอแห้ง จมูกแห้ง
- ง่วงซึม เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง
- คลื่นไส้ ท้องเสีย ไม่สบายท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสาคัญ: คลอร์เฟนิรามีน 2 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียมแผงละ 4 และ 10 เม็ด

ยาแก้ไอขับเสมหะ สำหรับเด็ก ชนิดน้ำ

ประกอบด้วย
แอมโมเนียมคาร์บอเนต
20 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
สารสกัดชะเอมเทศ
0.25 มิลลิลิตรต่อ 5 มิลลิลิตร
[ข้อควรค่า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ไอขับเสมหะ สำหรับเด็ก
- เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้ไอขับเสมหะ

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ในเด็กอายุ 1-12 ปี

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีอาการไอเรื้อรัง
- เป็นโรคหอบหืด
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็ก 1-3 ปี กินครั้งละ ครึ่งช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)
- เด็ก 3-6 ปี กินครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)
- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)
- กินยานี้วันละ 3-4 ครั้ง เมื่อมีอาการไอ

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมื้อถัดไป
- ไม่แนะนำให้ ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังกินยาถ้าอาการไอไม่ดีขึ้นภายใน 5 วัน
ควรไปพบแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดท้อง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควร
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตาม
ทะเบียนยา] หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือ
ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นน้ำ บรรจุในขวดปริมาตร 60 หรือ 120
มิลลิลิตร
- **ตัวยาสําคัญ** คือ แอมโมเนียมคาร์บอเนต (ammonium
carbonate) 20 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร และสารสกัด
ชะเอมเทศ (glycyrrhiza fluid extract) 0.25 มิลลิลิตร
ต่อ 5 มิลลิลิตร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยาแก้ไอน้ำดำ

ชนิดน้ำ

ประกอบด้วย

สารสกัดชะเอมเทศ

0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

แอนติโมนีโพแทสเซียมทาร์เทรต

1.2 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร

0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

[ข้อควรคำ ปรึบตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ไอน้ำดำ
- เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้ไอขับเสมหะ

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ที่มีอาการท้องร่วงเนื่องจากอาหารเป็นพิษ
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มโอปิออยด์
- ดับหรือไตทำงานบกพร่อง
- มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต หรือต่อมอดิพิต
- มีโรคหืด ต่อมลูกหมากโต ลมชัก อ้วน หรือโรคหัวใจ
- เคยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะ
- มีประวัติติดสารเสพติด
- วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ ครึ่ง ถึง 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
- กินยานี้วันละ 3-4 ครั้ง เมื่อมีอาการไอ

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมือถัดไป
- ไม่แนะนำ ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามกินยานี้ติดต่อกันเกิน 3 วัน เนื่องจากทำให้เกิดอาการดีอียา และติดยาได้
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
- หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้ทำให้ง่วงซึมได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ชัก
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป เห็นภาพไม่ชัด
- มึนงง สับสน อารมณ์แปรปรวน เห็นภาพหลอน
- ปวดท้องหรือปวดหลังอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคเกี่ยวกับต่อมอดิพิต

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว
- ง่วงซึม
- นอนไม่หลับ
- ปากแห้ง คอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก เบื่ออาหาร
- ปัสสาวะออกน้อย หรือปัสสาวะลำบาก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อยาให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นน้ำ บรรจุในขวดปริมาตร 60 มิลลิลิตร
- **ตัวยาสสำคัญ** คือ
 - สารสกัดชะเอมเทศ (glycyrrhiza fluidextract) 0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร
 - แอนติโมนีโพแทสเซียมทาร์เทรต (antimony potassium tartrate) 1.2 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
 - ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร (camphorated opium tincture) 0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

ยาตามแก้รังเวียน
เหล้าแอมโมเนียหอม
ชนิดสารละลาย
[ข้อการคำ ปรึบตามทะเลเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก/ยาใช้เฉพาะที่
ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า เหล้าแอมโมเนียหอม มีตัวยาคือ แอมโมเนียคาร์บอเนต (ammonium carbonate) และสารละลายแอมโมเนีย (ammonia solution)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ดมเพื่อบรรเทาอาการรังเวียน หน้ามืด
- ใช้ทาผิวหนัง เพื่อบรรเทาอาการจากพิษแมลงกัด ต่อย หรือถูกพิษมีพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ขุบสำลีแล้วดม เพื่อบรรเทาอาการรังเวียน หน้ามืด
- ใช้ทาลงบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ เพื่อบรรเทาอาการจากพิษแมลงหรือพิษ
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแยลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- รู้สึกแสบหรือระคายเคืองทางเดินหายใจ
- รู้สึกแสบหรือระคายเคืองบริเวณที่ทายา
- ไอ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเลเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นสารละลาย
- **ตัวยาคำคัญ** คือ แอมโมเนียคาร์บอเนต (ammonium carbonate) และสารละลายแอมโมเนีย (ammonia solution)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 มิลลิลิตร

ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก/ยาใช้เฉพาะที่
ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม ชื่อว่า ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้สูดดม เมื่อมีอาการ
- ทายาบางๆ บริเวณคอหรือหน้าอก เพื่อให้ยาระเหยเข้าสู่จมูก
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคืองบริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม
- **ตัวยาคือ** เมนทอล (menthol) การบูร (camphor, camphor spirit, borneo camphor) เมทิลซาลิไซเลต (methyl salicylate) น้ำมันเทียนสัตตบុษย์ (anise oil) น้ำมันมะกรูด (burgamot oil) น้ำมันคาจูปูท (cajuput oil) น้ำมันอบเชย (cassia oil) น้ำมันกานพลู (clove oil) น้ำมันสนเข็ม (dwarf – pine needle oil) น้ำมันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil) น้ำมันลาเวนเดอร์ (lavender oil) น้ำมันสะระแหน่ (peppermint oil) น้ำมันเสจ (sage oil) น้ำมันชาสเซอแฟรส (sassafras oil) น้ำมันสน (turpentine oil) ทิงเจอร์พริก (capsicum tincture) ทิงเจอร์มดยอบ (myrrh tincture) ทิงเจอร์ราแทนเจีย (ratanghis tincture) เทอร์พินอล (terpinol) ไทมอล (thymol) บอร์นิลอะซิเตต (bornyl acetate) ไลนาลิลอะซิเตต (linalyl acetate) ฟีนิลซาลิไซเลต (phenyl salicylate) สารสกัดคาโมมายล์ (standard chamomile extract) <ปรับปรุงข้อมูลตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย. <http://ndi.fda.moph.go.th>

ยาทาระเหย
บรรเทาอาการคัดจมูก
ชนิดซีฟิ่ง
[ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูก ชนิดซีฟิ่ง ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก และลดอาการจากหวัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีอาการต่อไปนี้

- มีโรคหอบหืด
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทายาบริเวณลำคอ หน้าอก และหลัง วันละ 2-4 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ใบหน้า ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ อาจทำให้มีอาการ อาเจียน ท้องเสีย ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าไปใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ผื่น แดง คัน หรือแสบร้อน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาซีฟิ่ง
- ตัวยาสำคัญ คือ เมนทอล (menthol), การบูร (camphor) น้ำมันคาเจพุท (cajuput oil) น้ำมันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil) น้ำมันสน (turpentine oil) <ปรับปรุงข้อมูลตามทะเบียนยา>

- ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 50 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ
โดเมนไฮดริเนท
ความแรง 50 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า โดเมนไฮดริเนท (dimenhydrinate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือ โรคหัวใจ
- ไต หรือ ตับ ทำงานผิดปกติ
- ผู้ป่วยโรคหอบหืด
- ต่อมลูกหมากโต มีภาวะปัสสาวะขัด
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- เป็นต้อหิน ความดันในลูกตาสูง

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1 เม็ด
- กินก่อนออกเดินทาง 30 นาที

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้วสามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นายานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ไม่ควรกินร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ปัสสาวะขัด ปัสสาวะออกน้อยลง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ ทันที

- ปากแห้ง คอแห้ง จมูกแห้ง
- ง่วงซึม สับสน วิงเวียน
- ตาพร่ามัว

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสําคัญ: โดเมนไฮดริเนท 50 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม 2 เม็ด

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ยาล้างตา ชนิดน้ำยาไอโซโทนิค [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาล้างตา ประกอบด้วย โซเดียม คลอไรด์ (sodium chloride) และวัตถุดิบเสริมที่เหมาะสม เช่น เบนซาลโคนียม คลอไรด์ (benzalkonium chloride) หรือ คลอร์เฮกซิดีน (chlorhexidine) [ปรับตามทะเบียนยา]

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา เนื่องจากสิ่งสกปรก ผงหรือควันเข้าตา

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้ล้างตาวันละ 2-3 ครั้ง
- วิธีการใช้ยา
 - เทน้ำยาลงในถ้วยล้างตาประมาณสามในสี่ของปริมาตรถ้วย
 - ก้มหน้าลงและยกถ้วยล้างตาขึ้นให้ปากถ้วยล้างตาแนบสนิทกับรอบดวงตา
 - เงยหน้าขึ้นและลืมตา กรอกตาไปมาในน้ำยา

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ล้างถ้วยล้างตาด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนนำมาใช้ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณขอบและด้านในถ้วยล้างตา เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่ถ้วยล้างตา
- หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดก่อนใช้ยาล้างตา
- ห้ามนำน้ำยาที่ใช้ล้างตาแล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแสบหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้มีอายุ 1 เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสไม่มีสี
- ตัวยาสาคัญ:
 - โซเดียม คลอไรด์
 - เบนซาลโคนียม คลอไรด์ หรือ คลอร์เฮกซิดีน
- ขนาดบรรจุ: ขวดละไม่เกิน 240 มิลลิลิตร พร้อมถ้วยล้างตา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

[ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.](http://ndi.fda.moph.go.th)

<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยากวาดคอ ชนิดน้ำ [ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยากวาดคอ ประกอบด้วยตัวยา โปแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide) ไอโอดีน (iodine) เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) น้ำมันสะระแหน่ (peppermint oil) และ กลีเซอริน (glycerin)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนผสมของยานี้
- ไตทำงานบกพร่องรุนแรง เช่น โรคไตวาย
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผสมน้ำสะอาดเท่ากับปริมาตรยาก่อนใช้
- ใช้กวาดในลำคอ

3.2 ถ้าหายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการ ผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการ เดียวกัน
- ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากเป็นจำนวนมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หากอาการ ไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ลิ้นรับรสผิดปกติ ไตรสโลหะในปาก
- รู้สึกแสบร้อนในปาก น้ำลายไหลเยอะผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อยาให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ
- ตัวยาสําคัญ:
 - โปแทสเซียมไอโอไดด์ 2.5 กรัม
 - ไอโอดีน 1.25 กรัม
 - เอทิลแอลกอฮอล์ 4 มิลลิลิตร
 - น้ำมันสะระแหน่ 0.4 มิลลิลิตร
 - กลีเซอริน ปริมาณ 100 มิลลิลิตร
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 15 มิลลิลิตร

ยาเอนเซียนไวโอเลต
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียน]

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เอนเซียนไวโอเลต (gentian violet)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทาแผลภายนอกที่เกิดจากเชื้อรา หรือใช้รักษาการติดเชื้อราที่ลิ้นและกระพุ้งแก้มในระยะสั้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้สำลีชุบน้ำยาทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง

3.2 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำสีม่วง
- ตัวยาสำคัญ: เอนเซียนไวโอเลต 1% w/v
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 15 และ 30 มิลลิลิตร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยาแก้ปวดฟัน

ชนิดน้ำ

[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า คลอโรบิวทานอล (chlorobutanol) และ น้ำมันกานพลู (clove oil)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดฟันเนื่องจากฟันผุ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนผสมของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ไม้เล็ก ๆ ฟันสำลีชุบน้ำยาอุดฟันตรงที่เป็นรู

3.2 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปาก หรือถูกบริเวณอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาทันตแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำใสมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาล
- ตัวยาสําคัญ:
 - คลอโรบิวทานอล
 - น้ำมันกานพลู
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 8 มิลลิลิตร

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**ยาอม
บรรเทาอาการระคายคอ
ชนิดเม็ด
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ ประกอบด้วย ยา เช่น สารหอมระเหย (volatile substance) สารสกัดจากสมุนไพร (herbal substance)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการระคายคอ ทำให้ชุ่มคอ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- อมครั้งละ 1-5 เม็ด ให้ละลายช้า ๆ ในปาก

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- หากใช้ยาแล้วอาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นใน 7 วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

แต่ถ้าอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสำคัญ เช่น :
 - เมนทอล 0.06-5 %w/w
 - น้ำมันยูคาลิปตัส 0.15-0.15 %w/w
 - น้ำมันสะระแทน 0.19-3.33 %w/w
 - น้ำมันกานพลู 0.67-4 %w/w
- ขนาดบรรจุ: ไม่เกิน 100 เม็ด หรือไม่เกิน 30 กรัม

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

**ยาอม
บรรเทาอาการเจ็บคอ
ชนิดเม็ด
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ประกอบด้วย ยา เอมีล เมทาครีซอล (amyl metacresol) และ 2,4-ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ (2,4 dichloro benzyl alcohol) และอาจมีวิตามินซี (ascorbic acid) [ปรับตามทะเบียนยา]

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
 - อมครั้งละ 1 เม็ด ให้ละลายช้า ๆ ในปาก ทุก 2-3 ชั่วโมง
 - ไม่ควรใช้ยาอมนี้เกิน 12 เม็ด ต่อวัน

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- หากอาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นหลังใช้ติดต่อกัน 3 วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ ให้รีบไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
- ตัวยาสำคัญ:
 - เอมีลเมทาครีซอล ไม่เกิน 0.6 มิลลิกรัม
 - 2,4-ไดคลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 1.2 มิลลิกรัม
 - วิตามินซี ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
- ขนาดบรรจุ: แผงอลูมิเนียมหรือแผงพลาสติก แผงละไม่เกิน 8 เม็ด

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยาใส่แผล
ทิงเจอร์ไอโอดีน
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาใส่แผลทิงเจอร์ไอโอดีน ประกอบด้วย ไอโอดีน (iodine) และ โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาแผลสด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังใช้ยา "ลิเทียม" ในการรักษาอาการคลุ้มคลั่ง
- ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- แผลเปิดขนาดใหญ่
- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาบริเวณที่เป็นแผล
- ไม่ควรใช้ผ้าพันหรือปิดแผลหลังทายา

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแฉกหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ระคายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากการใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายสีน้ำตาลเข้ม
- ตัวยาสาคัญ:
 - ไอโอดีน
 - โพแทสเซียมไอโอไดด์
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 15 และ 30 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**ยาใส่แผล
ทิงเจอร์ไทเมอโรซอล
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]**

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาใส่แผลทิงเจอร์ไทเมอโรซอล ประกอบด้วย ไทเมอโรซอล (thimerosal)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาแผลสด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาบริเวณที่เป็นแผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ระคายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใสสีเหลืองหรือน้ำตาล
- ตัวยาสาคัญ: ไทเมอโรซอล
- ขนาดบรรจุ: ขวดละ 15 และ 30 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ยาใส่แผล
โพวิโดน-ไอโอดีน
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาใส่แผลโพวิโดน-ไอโอดีน ประกอบด้วยโพวิโดน-ไอโอดีน (povidone-iodine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาแผลสด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังใช้ยา "ลิเทียม" ในการรักษาอาการคลุ้มคลั่ง
- ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2 ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- แผลเปิดขนาดใหญ่
- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาบริเวณที่เป็นแผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแฉ่งหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือจ้ำตามผิวหนัง
- ระคายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายสีน้ำตาลเข้ม
- ตัวยาสาคัญ: โพวิโดน-ไอโอดีน
- ขนาดบรรจุ: ขวดละไม่เกิน 120 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

[ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.](http://ndi.fda.moph.go.th)

<http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์

ชนิดน้ำ

[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียน]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดบาดแผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาทำความสะอาดบริเวณรอบบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียน] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใส สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
- ตัวยาสาคัญ: ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์
- สารแต่งสี: สีน้ำเงิน No.42090 [ปรับตามทะเบียน]
- ขนาดบรรจุ: ขวดละไม่เกิน 450 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาเอทิล แอลกอฮอล์ ชนิดน้ำ [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาเอทิล แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย เอทิล แอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดบาดแผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาทำความสะอาดบริเวณรอบบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใส สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
- ตัวยาสําคัญ: เอทิล แอลกอฮอล์
- สารแต่งสี: สีน้ำเงิน No.42090
- ขนาดบรรจุ: ขวดละไม่เกิน 450 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://ndi.fda.moph.go.th)
<http://ndi.fda.moph.go.th>

น้ำเกลือล้างแผล ชนิดน้ำ [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำเกลือล้างแผล ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดแผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- ใช้ล้างทำความสะอาดแผล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ห้ามนำน้ำยาที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือปนเปื้อนจากน้ำยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแฉงลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้มีอายุ 1 เดือนหลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: น้ำยาปราศจากเชื้อ สี ไม่มีสี
- ตัวยาสาคัญ: โซเดียม คลอไรด์
- ขนาดบรรจุ: ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

**น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
คลอโรไซลีนอล
ชนิดน้ำ
[ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]**

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล ประกอบด้วย คลอโรไซลีนอล (chloroxylenol) และ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดแผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้บริเวณที่มีผิวหนังอักเสบ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- เจือจางน้ำยา 1 ส่วนกับน้ำ 19 ส่วน ก่อนใช้
- ใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดรอบแผล
- ห้ามใช้ยานี้กับบาดแผลโดยตรง

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ระบายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังจากใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใส สีน้ำตาล
- ตัวอย่างสำคัญ:
 - คลอโรไซลีนอล
 - ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์
- ขนาดบรรจุ: ขวดละไม่เกิน 450 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม ชื่อว่า ยาหม่อง ซึ่งมีตัวยาสำคัญและส่วนประกอบตามที่ระบุในข้อ 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ จากแมลงกัดต่อย หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยาแอสไพริน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทายาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่สัมผัสโดนผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา ให้ล้างยาออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแสบหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าไปใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

• อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ผื่น แดง คัน หรือแสบร้อน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นขี้ผึ้ง
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เมทิลซาลิไซเลต (methyl salicylate) การบูร (camphor) เมนทอล (menthol) น้ำมันอบเชย (cinnamon oil) น้ำมันกานพลู (clove oil) น้ำมันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil) น้ำมันสะระแหน่ (peppermint oil) น้ำมันสน (turpentine oil) ทิงเจอร์พริก (capsicum tincture) โคลโลโฟน (colophony)
<ปรับปรุงข้อมูลตามทะเบียนยา>
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 30 กรัม

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยารักษาหิดเหา
เบนซิลเบนโซเอต
ความแรง 25%
ชนิดโลชั่น
[ข้อควรคำ ปรึตามทะเบียน]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เบนซิลเบนโซเอต (benzyl benzoate) ความแรง 25% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา หิด เหา และโลน

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- เชย้าขวดก่อนใช้ยา
- สำหรับรักษาหิด
 - อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน
 - ทายานี้ให้ทั่ว ทั้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วล้างออก
 - ทาซ้ำใหม่อีกครั้ง อีก 1 วัน
- สำหรับรักษาเหาและโลน
 - ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณที่มีเหาหรือโลน
 - ในกรณีที่มีเหาหรือโลนจำนวนมาก ให้ใส่ยา 2 ครั้ง เข้า-เย็น
 - ทิ้งไว้จนครบไว้ 24 ชั่วโมง
 - ล้างให้สะอาด
 - เมื่อครบ 7 วัน ให้ทายาซ้ำอีกครั้ง
- สำหรับเด็กเล็ก ให้แบ่งยามาเติมน้ำเท่าปริมาณยาที่จะใช้ แล้วผสมให้เข้ากัน
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- ระมัดระวังอย่าให้ยาโดนผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ให้ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ห้ามเพิ่มขนาดเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแยลงหรือไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ชักล้างเสื้อผ้าและชุดเครื่องนอน เพื่อกำจัด หิด เหาและโลนที่อาจจะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคือง แดง บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เบนซิลเบนโซเอต (benzyl benzoate)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 60 มิลลิลิตร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยารักษาหิด ชีฟิ่งกำมะถัน
ความแรง 10%
ชนิดชีฟิ่ง
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ชีฟิ่งกำมะถัน มีตัวยาคือ กำมะถัน (sublimed sulphur) ความแรง 10% โดยน้ำหนัก (w/w)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคหิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- อายุต่ำกว่า 12 ปี
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแฉงหรือไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ซักล้างเสื้อผ้าและชุดเครื่องนอน เพื่อกำจัดหิดที่อาจจะทำให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคืองบริเวณที่ทายา
- ผิวแห้ง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาชีฟิ่ง
- **ตัวยาสำคัญ** คือ กำมะถัน (sublimed sulphur)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า ชนิดขี้ผึ้ง [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยาเป็นยาสูตรผสม มีชื่อว่า ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า มีตัวยาคือ กรดเบนโซอิก (benzoic acid) และกรดซาลิไซลิก (salicylic acid)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา กลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคผิวหนังอักเสบ
- มีโรคสะเก็ดเงิน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป

- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ อาจทำให้มีอาการอาเจียน ท้องเสีย หรือส่งผลกระทบต่อระบบประสาทได้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากให้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- แสบ ร้อน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] **ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว**
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นยาขี้ผึ้ง
- **ตัวยาสำคัญ** คือ กรดเบนโซอิก (benzoic acid) และ กรดซาลิไซลิก (salicylic acid)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง
โคลทาร์
ความแรง 1%
ชนิดโลชั่น
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โคลทาร์ (coal tar) ความแรง 1% โดยน้ำหนัก (w/w)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง เช่น เรื้อน กลาก ผื่นคัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะภูมิแพ้รุนแรง
- มีภาวะผิวหนังแพ้แสง
- มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- เชย่าขวดก่อนใช้ยา
- ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะทายา ก่อนทายานี้
- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ในเด็กหรือผู้สูงอายุ ให้ผสมยานี้กับน้ำเล็กน้อย ก่อนทาบนผิวหนัง
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการโดนแสงอาทิตย์หลังจากทายานี้ เนื่องจากยาอาจจะทำให้เกิดอาการผิวหนังแพ้แสงได้
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคือง บริเวณที่ทายา
- ผิวหนังแพ้แสง
- มีตุ่มคล้ายสิ่วขึ้นบริเวณที่ทายา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสสำคัญ** คือ โคลทาร์ (coal tar)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาทาแก้ผดผื่นคัน
กาลาไมน์
ชนิดโลชั่น
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยาคือ กาลาไมน์ (calamine) และ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการผดผื่นคัน ระคายเคืองผิวหนังที่อาการไม่รุนแรง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- มีผิวหนังแห้ง

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทายาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง
- เชย่าขวดก่อนใช้ยา
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้าอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- ผื่น แดง คัน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสําคัญ** คือ กาลาไมน์ (calamine) และ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 180 มิลลิลิตร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยารักษาเกลื้อน
โซเดียมไทโอซัลเฟต
ชนิดผงสำหรับละลายน้ำ
สำหรับทา
[ข้อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium thiosulfate)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาเกลื้อน

2. ข้อควรระวัง

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไข้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกันจนตัวยาละลายหมด
- ทายาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ ทุกครั้งหลังอาบน้ำเสร็จ
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแสบหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- แสบ ร้อน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- ยาที่ผสมน้ำแล้วจะมีอายุ 15 วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นผงยา สำหรับผสมกับน้ำ
- **ตัวยาสำคัญ** คือ โซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium thiosulfate)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

วิตามินบีรวม ชนิดเม็ด หรือ ชนิดแคปซูล [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า วิตามินบีรวม
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินบี
- รักษาผู้ที่ขาดสารอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดวิตามินบี
- ใช้บำรุงร่างกาย
- เสริมสร้างสุขภาพหรือการเจริญเติบโตของร่างกาย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ <ปรับตามทะเบียนยา>

- เด็ก 9-18 ปี กินยานี้ครั้งละ <...> เม็ด<แคปซูล> วันละ <...> ครั้ง หลังอาหาร
- ผู้ใหญ่ กินยานี้ครั้งละ <...> เม็ด <แคปซูล> วันละ <...> ครั้ง หลังอาหาร

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำ ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที หากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ยานี้อาจทำให้ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ ซึ่งเป็นสีของวิตามินบีสอง และไม่เป็นอันตราย สามารถกินยาต่อได้ตามปกติ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว
- คลื่นไส้

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน .. องศาเซลเซียส <ปรับตามทะเบียนยา>
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ <ปรับตามทะเบียนยา>
- ตัวยาสําคัญ <ปรับตามทะเบียนยา>
 - วิตามินบีหนึ่ง (vitamin b1)
 - วิตามินบีสอง (vitamin b2)
 - วิตามินบีสาม (nicotinamide)
 - วิตามินบีห้า (pantothenic acid)
 - วิตามินบีหก (vitamin b6)
 - วิตามินบีสิบสอง (vitamin b12)
 - ไบโอติน (biotin)
 - กรดโฟลิก (folic acid)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10 เมษายน 2567
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://ndi.fda.moph.go.th)
<http://ndi.fda.moph.go.th>

วิตามินซี
ชนิดเม็ด
ความแรง 100 มิลลิกรัม
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า วิตามินซี
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันการขาดวิตามินซี

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีแคลเซียมออกซาเลตปนออกมากับปัสสาวะ

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีการทำงานของไตบกพร่อง
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 1 เม็ด
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2 เม็ด
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามใช้ยานี้ เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว
- ปวดท้อง ท้องเสีย
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปัสสาวะออกมาก

“ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทโดยตรง หรือในที่ชื้น
เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตาม
ทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นเม็ด บรรจุในแผงพลาสติกหรือแผง
อลูมิเนียม แผงละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด
- **ตัวยาสำคัญ** คือ วิตามินซี (Ascorbic acid) 100
มิลลิกรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยาบำรุงโลหิต
เฟอร์รัสซัลเฟต
ชนิดเม็ด
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เฟอร์รัสซัลเฟต (ferrous sulfate)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาบำรุงโลหิต

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- อยู่ระหว่างได้รับการรักษาด้วยการให้เลือด
- อยู่ระหว่างได้รับการรักษาด้วยการให้ธาตุเหล็กแบบฉีด
- มีโรคเกี่ยวกับการดูดซึมและเก็บธาตุเหล็กไว้ในร่างกายมากเกินไป
- มีแผลในกระเพาะอาหาร หรือโรคลำไส้อักเสบ
- มีภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เพิ่งได้รับการผ่าตัดลำไส้ มีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหาร โรคลำไส้อักเสบ หรือความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้
- มีโรคเบาหวาน
- มีภาวะขาดวิตามินบี 12
- มีโรคเกี่ยวกับเลือด
- มีภาวะเหล็กเกิน
- มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยาครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
- กินยานี้พร้อมกับน้ำ ห้ามหักแบ่งหรือเคี้ยวเม็ดยา เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองทางเดินอาหาร

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ในช่วงที่รับประทานยานี้ อาจจะทำให้อุจจาระมีสีดำได้
- ในกรณีที่มีอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้หลังรับประทานยา ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาจนถึงขนาดที่แนะนำ เพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก มีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ท้องผูกหรือท้องเสีย
- ปวดท้อง
- อุจจาระเป็นสีดำ
- ความอยากอาหารลดลง
- มีแผลในปาก

“ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา]
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นเม็ด บรรจุในแผงพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียม แผงละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด
- ตัวยาสสำคัญ คือ เฟอร์รัสซัลเฟต คิดเป็นปริมาณธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

วิตามินรวม
ชนิดเม็ด/ชนิดแคปซูล
[ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า วิตามินรวม
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาผู้ที่มีภาวะขาดวิตามิน
- รักษาผู้ที่ขาดสารอาหารหรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดวิตามิน
- ใช้บำรุงร่างกาย
- เสริมสร้างสุขภาพหรือการเจริญเติบโตของร่างกาย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ <ปรับตามทะเบียนยา>

- เด็ก 9-18 ปี กินยานี้ครั้งละ <...> เม็ด <แคปซูล> วันละ <...> ครั้ง หลังอาหาร
- ผู้ใหญ่ กินยานี้ครั้งละ <...> เม็ด <แคปซูล> วันละ <...> ครั้ง หลังอาหาร

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที หากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ใช้ยาในขนาดที่แนะนำ หรือตามขนาดที่แพทย์สั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้อาสาสมัครในร่างกายนทำให้เกิดอาการอันตราย
- ยานี้อาจทำให้บัสสาวะมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ ซึ่งเป็นสีของวิตามินบีสอง และไม่เป็นอันตราย สามารถกินยาต่อได้ตามปกติ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือมีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดท้อง
- คลื่นไส้

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน .. องศาเซลเซียส <ปรับตามทะเบียนยา>
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ <ปรับตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสาคัญ** <ปรับตามทะเบียนยา>
 - วิตามินเอ (vitamin A)
 - วิตามินดี (vitamin D)
 - วิตามินซี (vitamin C)
 - วิตามินบีหนึ่ง (vitamin B1)
 - วิตามินบีสอง (vitamin B2)
 - วิตามินบีสาม (nicotinamide)
 - วิตามินบีหก (vitamin B6)
 - วิตามินบีสิบสอง (vitamin B12)
 - กรดโฟลิก (folic acid)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10 เมษายน 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

น้ำมันตับปลา ชนิดแคปซูล [ข้อการคำ ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำมันตับปลา
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันการขาดวิตามินเอ และ วิตามินดี ในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง
- มีนิ่วในไต หรือไตทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ
- เป็นโรคหัวใจ
- มีภาวะร่างกายอักเสบจากภูมิคุ้มกัน (sarcoidosis)
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยานี้ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำ ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ใช้ยาในขนาดที่แนะนำ หรือตามขนาดที่แพทย์สั่ง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้อาสาสมัครในร่างกายนทำให้เกิดอาการ
อันตราย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์
- ความอยากอาหารลดลง
- กระจายน้ำ
- ปวดท้อง ท้องผูก
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ง่วงซึม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเทโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นเม็ด บรรจุในแผงพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียม แผงละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด
- **ตัวยาสำคัญ** คือ วิตามินเอ (retinol) ไม่เกิน 4,000 IU และ วิตามินดี (cholecalciferol) ไม่เกิน 300 IU

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

น้ำมันตับปลา ชนิดน้ำ [ชื่อการค้า ปรับตามทะเบียนยา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำมันตับปลา
- เป็นยาในกลุ่ม วิตามิน

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันการขาดวิตามินเอ และ วิตามินดี ในเด็ก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง
- มีนิ่วในไต หรือไตทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีการทำงานของตับหรือไตผิดปกติ
- เป็นโรคหัวใจ
- มีภาวะร่างกายอักเสบจากภูมิคุ้มกัน (sarcoidosis)
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็กอายุ แรกเกิด ถึง 1 ปี กินครั้งละ ¼ ช้อนชา (1.25 มิลลิลิตร)
- เด็กอายุ 1-4 ปี กินครั้งละ ครึ่งช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)
- เด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 1 ช้อนชา
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่แนะนำให้ ให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล
พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ใช้ยาในขนาดที่แนะนำ หรือตามขนาดที่แพทย์สั่ง
เพื่อป้องกันไม่ให้อาสาสมัครในร่างกายนทำให้เกิดอาการ
อันตราย

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ความอยากอาหารลดลง
- กระหายน้ำ
- ปวดท้อง ท้องผูก
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ง่วงซึม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส [ปรับตามทะเบียนยา] ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นน้ำ บรรจุในขวดขนาด 120, 240 หรือ 400 มิลลิลิตร
- **ตัวยาสําคัญ** คือ วิตามินเอ (retinol) ไม่เกิน 4,000 IU ต่อ 5 มิลลิลิตร และ วิตามินดี (cholecalciferol) ไม่เกิน 300 IU ต่อ 5 มิลลิลิตร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://ndi.fda.moph.go.th>