

(ร่าง)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๕) (๗) (๘) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๗๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑.๙) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒

“(๑.๙) ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อน ชนิดเม็ด

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium alginate ๒๕๐ - ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

Sodium bicarbonate ๙๕ - ๓๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

Calcium carbonate ๗๐ - ๓๖๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

สรรพคุณ ๑. บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน หรือ

๒. บรรเทาอาการแสบร้อน บริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว และ

อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีค่าความสามารถ ในการสะเทินกรด ในกระเพาะอาหาร (Acid Neutralizing Capacity : ANC) ไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิเอควิวาเลนซ์ (mEq) ต่อขนาดการใช้ยาหนึ่งครั้ง

(โดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์พิจารณาตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

ขนาดบรรจุ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๒๐ เม็ด

คำเตือนในฉลาก ๑. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

๒. หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลงให้หยุดยา และไปพบแพทย์ทันที

๓. ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง

ในกรณีที่มีการใช้แอสปาแตมเป็นสารให้ความหวาน ให้ระบุดำเตือน

เพิ่มเติมดังนี้

๔. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสถานะฟินิลคีโตนูเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาแตม

ขนาดและวิธีใช้ คำเตือนบนเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน การเก็บรักษา การแสดง
ข้อความอื่นบนเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(โดยให้แนบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนไปกับทุกขนาดบรรจุภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค)

“(๑.๑๐) ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อน
ชนิดน้ำ

ในสูตรตำรับ ๑๐ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium alginate ๒๕๐ - ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

Sodium bicarbonate ๙๕ - ๓๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

Calcium carbonate ๗๐ - ๓๖๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

สรรพคุณ ๑. บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และ
อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน หรือ

๒. บรรเทาอาการแสบร้อน บริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว และ

อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีค่าความสามารถ ในการสะเทินกรด
ในกระเพาะอาหาร (Acid Neutralizing Capacity : ANC) ไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิเอควิวาเลนซ์ (mEq) ต่อขนาดการใช้
ยาหนึ่งครั้ง

(โดยให้คำแนะนำการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์พิจารณาตามสูตรตำรับ
ที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

ขนาดบรรจุ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิลิตร

คำเตือนในฉลาก ๑. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

๒. หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลงให้หยุดยา และ
ไปพบแพทย์ทันที

๓. ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน
๒ ชั่วโมง

ในกรณีที่มีการใช้แอสปาแตมเป็นสารให้ความหวาน ให้ระบุดำเตือน

เพิ่มเติมดังนี้

๔. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสถานะฟิโนลคิโตนูเรีย ยานี้มีส่วนประกอบ
ของแอสปาแตม

ขนาดและวิธีใช้ คำเตือนบนเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน การเก็บรักษา การแสดง
ข้อความอื่นบนเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(โดยให้แนบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนไปกับทุกขนาดบรรจุภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค)

ประกาศ ณ วันที่

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน
ชนิดน้ำ

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ
ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 10 มิลลิลิตร มีตัวยาโซเดียมแอลจิเนต 500 มิลลิกรัม
โซเดียมไบคาร์บอเนต 267 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 160
มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว และ
อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

• ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น
เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

• ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
• หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบ
แพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

• ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร (2-4
ช้อนชา) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
• เขย่าขวด/ชองก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

• ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กิน
ยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

• ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมี
อาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
• ถ้ากินยามีมากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการ
อย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่ง
โรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

• ในกรณีที่ใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน
(tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือ
ของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid
hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต
(bisphosphonates) และเอสตรามีสทิน (estramustine) ควรกิน
ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
• เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกิน
อาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หายใจลำบาก เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออก
ผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มีนาคม 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน ชนิดเม็ด

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 1 เม็ด มีตัวยาโซเดียมแอลจินेट 250 มิลลิกรัม โซเดียมไบคาร์บอเนต 133.5 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 80 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็โรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 2-4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ในกรณีที่ใช้กินยาร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และเอสตรามีสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออก ผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มีนาคม 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ชนิดน้ำ

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 10 มิลลิลิตร มีตัวยาโซเดียมแอลจินเนต 500 มิลลิกรัม โซเดียมไบคาร์บอเนต 213 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 325 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

• ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

• ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
• หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

• ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร (2-4 ช้อนชา) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
• เขย่าขวด/ชงก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

• ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

• ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
• ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

• ในกรณีที่กินยาร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และเอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
• เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มีนาคม 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ชนิดเม็ด

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 1 เม็ด มีตัวยาโซเดียมแอลจินเนต 250 มิลลิกรัม โซเดียมไบคาร์บอเนต 106.5 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 187.5 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟิโนลดีโคโนเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาเดม

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 2-4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เดี่ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยามากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ในกรณีที่กินยาร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และเอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออก ผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มีนาคม 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ใช้ตัวอักษร Tahoma ขนาด 11